

# 公立保育園給食(提供食)の放射線量測定結果【乳児】

2019年1月分  
海老名市 保育・幼稚園課 保育・幼稚園係

## 検査結果等

検査日	提供期間	日数	総重量 (kg)	測定結果(Bq / Kg)						内部被ばくの 実効線量 ( $\mu$ Sv) ※2	
				放射性 ヨウ素131		放射性 セシウム134		放射性 セシウム137			
				※1 暫定 規制値	実測値	※1 基準値	実測値	基準値	実測値		
1月15日	1/4 ~ 1/11 (牛乳を除く)	7	1.148	300 ※3 検出限界値 0.51	限界値未満	Cs137 と合計 で10	※3 検出限界値 0.35	限界値未満	Cs134 と合計 で10	※3 検出限界値 0.60	0 ~ 0.024 未満 ※4
1月15日	1/4 ~ 1/11 (牛乳のみ)	7	1.163	300 ※3 検出限界値 0.52	限界値未満	Cs137 と合計 で50	※3 検出限界値 0.51	限界値未満	Cs134 と合計 で50	※3 検出限界値 0.68	0 ~ 0.032 未満 ※4
検査期間の合計 (H30.3.31 ~ H31.1.11)		229	84.605 ※6							0.000 ~ ##### 未満 ※6	

※1 基準値は、平成24年4月施行の飲料水、牛乳の値を参考に記載しています。(放射性セシウムの基準値は合計値です。)

なお、放射性ヨウ素は、当初の暫定規制値を参考に記載しています。

※2 内部被ばくの実効線量とは、給食により人体が受ける放射線の影響度を表します。

・食物から受ける放射線の量は1年間で250 $\mu$ Sv~300 $\mu$ Svとされています。

・緊急時における食品の放射能測定マニュアル(平成14年3月 厚生労働省発行)に基づき計算しています。

※3 検出限界値は、検出できる最小値で、検体ごとに変動します。

※4 測定結果が限界値未満だった場合、計算される内部被ばくの実効線量は、セシウム134、137が0から検出限界値と等量まで含まれていたと仮定して計算しています。

※5 測定の結果、検出された項目(核種)はその実数を用い、検出されなかった項目(核種)については0から検出限界値と等量まで含まれていたと仮定して計算しています。

※6 検査期間の合計欄には、牛乳を除く検体と牛乳のみの検体のそれぞれを合算した値を記載しています。

【参考】 食品衛生法上の基準値 (平成24年4月1日 施行)

【放射性セシウム】		
	飲料水	10 Bq/kg
	牛乳	50 Bq/kg
	一般食品	100 Bq/kg
	乳児用食品	50 Bq/kg

食品衛生法上の暫定規制値 (平成23年3月17日 通知)

【放射性ヨウ素】	飲料水、牛乳、乳製品	300 Bq/kg
----------	------------	-----------

(注)100Bq/kgを超えるものは、乳児用調整粉乳及び直接飲用に供する乳に使用しないように指導することとされています。

# 公立保育園給食(提供食)の放射線量測定結果【乳児】

2019年1月分  
海老名市 保育・幼稚園課 保育・幼稚園係

## 検査結果等

検査日	提供期間	日数	総重量 (kg)	測定結果(Bq / Kg)						内部被ばくの 実効線量 ( $\mu$ Sv) ※2
				放射性 ヨウ素131		放射性 セシウム134		放射性 セシウム137		
				※1 暫定 規制値	実測値	※1 基準値	実測値	基準値	実測値	
1月21日	1/12 ~ 1/18 (牛乳を除く)	6	1.034	300 ※3 検出限界値 0.45	限界値未満	Cs137 と合計 で10	※3 検出限界値 0.54	Cs134 と合計 で10	※3 検出限界値 0.72	※4 0 ~ 0.030 未満
1月21日	1/12 ~ 1/18 (牛乳のみ)	6	0.81	300 ※3 検出限界値 0.58	限界値未満	Cs137 と合計 で50	※3 検出限界値 0.40	Cs134 と合計 で50	※3 検出限界値 0.61	※4 0 ~ 0.018 未満
検査期間の合計 (H30.3.31 ~ H31.1.18)		235	86.449 ※6							※6 0.000 ~ ##### 未満

※1 基準値は、平成24年4月施行の飲料水、牛乳の値を参考に記載しています。(放射性セシウムの基準値は合計値です。)

なお、放射性ヨウ素は、当初の暫定規制値を参考に記載しています。

※2 内部被ばくの実効線量とは、給食により人体が受ける放射線の影響度を表します。

・食物から受ける放射線の量は1年間で250 $\mu$ Sv~300 $\mu$ Svとされています。

・緊急時における食品の放射能測定マニュアル(平成14年3月 厚生労働省発行)に基づき計算しています。

※3 検出限界値は、検出できる最小値で、検体ごとに変動します。

※4 測定結果が限界値未満だった場合、計算される内部被ばくの実効線量は、セシウム134、137が0から検出限界値と等量まで含まれていたと仮定して計算しています。

※5 測定の結果、検出された項目(核種)はその実数を用い、検出されなかった項目(核種)については0から検出限界値と等量まで含まれていたと仮定して計算しています。

※6 検査期間の合計欄には、牛乳を除く検体と牛乳のみの検体のそれぞれを合算した値を記載しています。

【参考】 食品衛生法上の基準値 (平成24年4月1日 施行)

【放射性セシウム】		
	飲料水	10 Bq/kg
	牛乳	50 Bq/kg
	一般食品	100 Bq/kg
	乳児用食品	50 Bq/kg

食品衛生法上の暫定規制値 (平成23年3月17日 通知)

【放射性ヨウ素】	飲料水、牛乳、乳製品	300 Bq/kg
----------	------------	-----------

(注)100Bq/kgを超えるものは、乳児用調整粉乳及び直接飲用に供する乳に使用しないように指導することとされています。

# 公立保育園給食(提供食)の放射線量測定結果【乳児】

2019年1月分  
海老名市 保育・幼稚園課 保育・幼稚園係

## 検査結果等

検査日	提供期間	日数	総重量 (kg)	測定結果(Bq / Kg)						内部被ばくの 実効線量 ( $\mu$ Sv) ※2
				放射性 ヨウ素131		放射性 セシウム134		放射性 セシウム137		
				※1 暫定 規制値	実測値	※1 基準値	実測値	基準値	実測値	
1月28日	1/19 ~ 1/25 (牛乳を除く)	6	1.089	300	限界値未満 ※3 検出限界値 0.49	Cs137 と合計 で10	限界値未満 ※3 検出限界値 0.54	Cs134 と合計 で10	限界値未満 ※3 検出限界値 0.64	0 ~ 0.029 未満 ※4
1月28日	1/19 ~ 1/25 (牛乳のみ)	6	1.097	300	限界値未満 ※3 検出限界値 0.52	Cs137 と合計 で50	限界値未満 ※3 検出限界値 0.64	Cs134 と合計 で50	限界値未満 ※3 検出限界値 0.67	0 ~ 0.033 未満 ※4
検査期間の合計 (H30.3.31 ~ H31.1.25)		241	88.635							0.000 ~ ##### 未満 ※6

※1 基準値は、平成24年4月施行の飲料水、牛乳の値を参考に記載しています。(放射性セシウムの基準値は合計値です。)

なお、放射性ヨウ素は、当初の暫定規制値を参考に記載しています。

※2 内部被ばくの実効線量とは、給食により人体が受ける放射線の影響度を表します。

・食物から受ける放射線の量は1年間で250 $\mu$ Sv~300 $\mu$ Svとされています。

・緊急時における食品の放射能測定マニュアル(平成14年3月 厚生労働省発行)に基づき計算しています。

※3 検出限界値は、検出できる最小値で、検体ごとに変動します。

※4 測定結果が限界値未満だった場合、計算される内部被ばくの実効線量は、セシウム134、137が0から検出限界値と等量まで含まれていたと仮定して計算しています。

※5 測定の結果、検出された項目(核種)はその実数を用い、検出されなかった項目(核種)については0から検出限界値と等量まで含まれていたと仮定して計算しています。

※6 検査期間の合計欄には、牛乳を除く検体と牛乳のみの検体のそれぞれを合算した値を記載しています。

【参考】 食品衛生法上の基準値 (平成24年4月1日 施行)

【放射性セシウム】		
	飲料水	10 Bq/kg
	牛乳	50 Bq/kg
	一般食品	100 Bq/kg
	乳児用食品	50 Bq/kg

食品衛生法上の暫定規制値 (平成23年3月17日 通知)

【放射性ヨウ素】	飲料水、牛乳、乳製品	300 Bq/kg
----------	------------	-----------

(注)100Bq/kgを超えるものは、乳児用調整粉乳及び直接飲用に供する乳に使用しないように指導することとされています。

# 公立保育園給食(提供食)の放射線量測定結果【乳児】

2019年1月分  
海老名市 保育・幼稚園課 保育・幼稚園係

## 検査結果等

検査日	提供期間	日数	総重量 (kg)	測定結果(Bq / Kg)						内部被ばくの 実効線量 ( $\mu$ Sv) ※2
				放射性 ヨウ素131		放射性 セシウム134		放射性 セシウム137		
				※1 暫定 規制値	実測値	※1 基準値	実測値	基準値	実測値	
2月4日	1/26 ~ 2/1 (牛乳を除く)	6	1.043	300 ※3 検出限界値 0.59	限界値未満	Cs137 と合計 で10	※3 検出限界値 0.50	Cs134 と合計 で10	※3 検出限界値 0.71	0 ~ 0.029 未満 ※4
2月4日	1/26 ~ 2/1 (牛乳のみ)	6	1.096	300 ※3 検出限界値 0.55	限界値未満	Cs137 と合計 で50	※3 検出限界値 0.60	Cs134 と合計 で50	※3 検出限界値 0.50	0 ~ 0.028 未満 ※4
検査期間の合計 (H30.3.31 ~ H31.2.1)		247	90.774 ※6							0.000 ~ ##### 未満 ※6

※1 基準値は、平成24年4月施行の飲料水、牛乳の値を参考に記載しています。(放射性セシウムの基準値は合計値です。)

なお、放射性ヨウ素は、当初の暫定規制値を参考に記載しています。

※2 内部被ばくの実効線量とは、給食により人体が受ける放射線の影響度を表します。

・食物から受ける放射線の量は1年間で250 $\mu$ Sv~300 $\mu$ Svとされています。

・緊急時における食品の放射能測定マニュアル(平成14年3月 厚生労働省発行)に基づき計算しています。

※3 検出限界値は、検出できる最小値で、検体ごとに変動します。

※4 測定結果が限界値未満だった場合、計算される内部被ばくの実効線量は、セシウム134、137が0から検出限界値と等量まで含まれていたと仮定して計算しています。

※5 測定の結果、検出された項目(核種)はその実数を用い、検出されなかった項目(核種)については0から検出限界値と等量まで含まれていたと仮定して計算しています。

※6 検査期間の合計欄には、牛乳を除く検体と牛乳のみの検体のそれぞれを合算した値を記載しています。

【参考】 食品衛生法上の基準値 (平成24年4月1日 施行)

【放射性セシウム】		
	飲料水	10 Bq/kg
	牛乳	50 Bq/kg
	一般食品	100 Bq/kg
	乳児用食品	50 Bq/kg

食品衛生法上の暫定規制値 (平成23年3月17日 通知)

【放射性ヨウ素】	飲料水、牛乳、乳製品	300 Bq/kg
----------	------------	-----------

(注)100Bq/kgを超えるものは、乳児用調整粉乳及び直接飲用に供する乳に使用しないように指導することとされています。